

Det er tid for vekstregulering.

Cerone[®]

- fleksibel og blandbar!

Vekstregulering med Cerone reduserer strekningsveksten slik at strået forkortes og styrkes. Faren for legde reduseres, det samme gjør risikoen for aks- og stråknakk. På den måten holder en frodig åker seg stående.

For å sikre god avlingskvalitet er det viktig å unngå at åkeren legger seg i løpet av vekstsesongen. Mye legde betyr vanskeligere og dyrere innhøsting. Mange av kornsortene våre er stråstive, men alt etter vær, gjødsling og vekstskifte kan vekstregulering allikevel være aktuelt spesielt i 6-rads bygg, rug og mathvete.



Både ved tidlig og sein behandling kan det være aktuelt å kombinere vekstregulering med soppssprøyting. Ved blanding med soppmidler skal dosen til Cerone reduseres med 20 - 30 %.

HVETE

Dagens høsthvetesorter er stråstive og stråkortes gjerne tidlig der det er god vekst. Når hveteåkeren står svært frodig fram mot skyting kan det allikevel være fare for legde senere, og det bør vurderes om det er nødvendig å følge opp med en seinere stråkorting.

Lite regn denne våren har påvirket veksten til høsthveten flere steder. Ved en lang periode uten regn tidlig i vekstperioden blir kornet stresset, og det er lite aktuelt å stråkorte før veksten har kommet i gang igjen. Det vil derfor være nødvendig å se på behovet for stråkorting utover sesongen, og vurdere om det er nødvendig å komme igjen med en senere behandling i kombinasjon med soppSprøyting. Cerone kan blandes med de fleste soppmidler unntatt Acanto Prima.

Anbefaling for bruk i høst og vårhvete:

I **høsthvete** er det aktuelt å sprøyte fra 2. leddknote er synlig og fram til begynnende aksskyting. Stor risiko for legde krever høyeste dose, mens i åkrer med liten fare for legde kan man bruke laveste dose.

Bruk 25-75 ml Cerone per daa der det ikke er brukt annen vekstregulering tidlig.
Bruk 15-50 ml Cerone per daa der det er sprøytet med Cycocel tidlig.

Blanding med soppmidler:

Cerone dosen reduseres med 20 - 30 % avhengig av eventuell tidligere behandling.
+ 40 ml Proline der det er hvetebbladprikk (Z32-39)
+ 100 ml Stereo der det ikke er hvetebbladprikk
+ 50 ml Delaro + 25 ml Proline (Z 45-49)
+ 30 ml Comet + 60 ml Proline

I **vårhvete** kan Cerone brukes fra øverste blad er synlig og fram til rett før skyting. Dosen er avhengig av hvor stor risiko det er for legde. Det kan være aktuelt å kombinere vekstregulering med en tidlig soppSprøyting. Hvilket soppmiddel som brukes er avhengig av hvilke sykdommer som skal bekjempes.

Bruk 20-50 ml Cerone per daa

Blanding med soppmidler:

Cerone dosen reduseres med 20 - 30 %.
+ samme anbefaling som for høsthvete

BYGG

I bygg bør de fleste 6-radssortene vekstreguleres. 6-rads bygg er stråsvakt i perioden rett før og under skyting. Spesielt ved dyrkning av Edel bør det stråkortes. 2-radssorter er mer stråstive, men man bør allikevel være oppmerksom på skifter med moldrik jord og steder det brukes mye husdyrgjødsel. Dersom det er mye ugras i åkeren, bør man også vurdere vekstregulering.

Anbefaling for bruk i bygg:

Cerone kan brukes fra flaggbladet er synlig til snerpet kommer frem.

Bruk 20-50 ml Cerone per daa avhengig av risiko for legde.

Blanding med soppmidler:

Cerone dosen reduseres med 20 - 30 %.

+ 50-80 ml Delaro per daa (Z 32-49)

+ 50 ml Delaro + 20 ml Proline

+ andre aktuelle soppmidler (unntatt Acanto Prima)

RUG

Mange av våre rugsorter har lange strå, noe som medfører stor risiko for legde. For å sikre god avlingskvalitet sprøytes det gjerne to ganger med vekstregulerende midler i rug.

Anbefaling for bruk i rug:

Rug kan sprøytes fra 2. leddknote er synlig og fram til begynnende aksskyting. Stor risiko for legde krever høyeste dose, mens i åkrer med liten fare for legde kan man bruke laveste dose.

Bruk 50-100 ml Cerone per daa det ikke er brukt annen vekstregulering tidlig.

Bruk 25-75 ml Cerone per daa der det er sprøytet med Cycocel tidlig.

Blanding med soppmidler:

Cerone dosen reduseres med 20 - 30 % avhengig av eventuell tidligere behandling.

+ 50-100 ml Delaro per daa

+ 50 ml Delaro + 25 ml Proline

+ andre aktuelle soppmidler (unntatt Acanto Prima)

Tips for bruk av Cerone:

Cerone må kun brukes i frodig åker med risiko for legde.

Cerone må ikke sprøytes på korn som er under stress som følge av sykdomsangrep eller nedbørsunderskudd.

Cerone må ikke sprøytes på legde.

Cerone må ikke sprøytes tidligere enn en uke etter en ugrasbehandling.

Ved tankblanding med sopp- og insektmidler reduseres doseringen med 20 - 30 %.

Overdosering vil kunne føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom sida på bladslira, flere grønn- skudd og nedsatt avling.



Den **enkle** løsningen!